



Pulmicort Turbuhaler

(budesonida)



NO USAR PARA TRATAR ATAQUE DE ASMA AGUDO

¿Qué es?

Pulmicort es su **medicina de control diario**. La medicina ayuda a controlar la inflamación e irritación de sus tubos respiratorios.

¿Cuándo se usa?

Use ____ soplos de Pulmicort ____ veces al día.

¿Cómo lo uso?

Pulmicort debe ser usado diariamente para que funcione bien. No es una medicina de rescate.

1. **Desenrosque** la tapa
2. **Gire** la empuñadura marrón hacia la derecha completamente
3. **Gire** la empuñadura marrón a la izquierda y escuchará un clic,
4. **No lo agite!!!**
5. **Espire**
6. **Ponga** la boquilla en la boca y iaspire fuerte y rápido!
7. **Repita** si se ha recetado más de una dosis
8. **Ponga** la tapa nuevamente, gírela y ciérrela



*Usted verá una marca roja en la parte superior de la ventanilla cuando queden 20 dosis. Usted debe reordenar su Pulmicort MDA cuando esto suceda. La marca roja en el fondo de la ventanilla del inhalador quiere decir que está vacío.



¿Cuáles son los efectos secundarios comunes?

- Nariz floja y resfriado
- Parches cremosos en la boca (infección de hongos)
- Dolor de cabeza
- Ronquera

Para más información, por favor visite <http://www.pulmicort.com/>